

“ APLICACIÓN URBANA ”



coumatetrailil

RODENTICIDA anticoagulante, pasta, del grupo de las coumarinas

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente activo:

Coumatetraili: 4-Hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilil)-2H-1-benzopiran-2-ona.
(Equivalente a 0.375 g de 1.a/Kg)

Ingredientes inertes:

Agente amargante, cebo, disolvente y colorante.

TOTAL

RSCO-URB-RODE-513-319-308-0.0375

% en peso

0.0375

99.6625
100.0000

Contenido neto: 1.5 Kg

Nocivo en caso de ingestión



ÁREA SIN BARNIZ /
LACQUER-FREE AREA

No. de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V.

Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Colonia Santa Clara, C.P. 55540, Ecatepec de Morelos, Edo. de México.

Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V. División CropScience

Bvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 269, Colonia Granada, C.P. 11520, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
Tel. (55) 5715 2001 Centro de Atención Telefónica 01 800 2283 727 LADA sin costo www.saludambiental.com.mx

“HECHO EN ITALIA” ENVASADO EN MEXICO

© Marca Registrada por Bayer RFC: BME82611SU5

— ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD —



PRECAUCIÓN

MX5742499G



7 501051 194135

Producto autorizado para usarse en la industria alimentaria y áreas de proceso de alimentos.
Determinar los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo, dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, microras y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.
Inspeccionar las áreas, techos al techar de y vigorear el cebo consumido. Mantener una detección ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de los roedores. Posteriormente repetir el tratamiento a intervalos semanales, hasta que desaparezca el consumo de cebos o se detecte la disminución de ellos.
Para prevenir resistencias se recomienda aplicar tratamientos de mantenimiento. En caso de resistencia, se deberá repetir el tratamiento.
Precaución: disponer adecuadamente de los roedores muertos y del cebo no consumido.
Para evitar el posible entesitamiento se deberá eliminar en lo posible las situaciones que propicien el desarrollo de roedores como basura, agua y alimentos a su alcance, así como sitios de bñigo y eliminar el exceso mediante técnicas de controlación téica y mantenimiento de las instalaciones.
El uso de cebadores herméticos incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. En caso de instalaciones con resistencias puede modificar el grado de adaptación o apariencia por parte de los roedores.
GARANTÍA
Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad inalterable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

Tiempo de reentrada a los sitios tratados

Debido a que este producto es un rodenticida anticoagulante y a que su aplicación es localizada, es posible reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

Contraindicaciones

Racumin® Pasta es un cebo rodenticida listo para su uso y no requiere mezclarse con ningún producto. El contacto con insecticidas puede modificar el grado de adaptación o apariencia por parte de los roedores.

PLAGAS	CANTIDAD DE CEBO POR PUNTO DE CEBAO	OBSERVACIONES
RAZAS Rata común o de alcantarillas Rata ratón Rata negra Rata norueguesa	50 a 100 g	Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o indicó a madriguera cada 3 a 10 metros.
RAZONES Ratón doméstico Ratón de campo Peromyscus maniculatus	20 a 50 g	Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado, cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.

“INSTRUCCIONES DE USO”
METODO DE APLICACIÓN
Racumin® Pasta consiste en una succulenta formulación recomendada para situaciones de infestación o hienras. Efectivo para el control de las siguientes roedores:

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
Durante el manejo del producto Racumin® Pasta se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos y lentes de seguridad básicamente.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBAZAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
- LÁVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERA, NHALE Y ENTISE EL CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL.

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

Manténgase al paciente despierto y en reposo, límpese al médico. En caso de contacto con los ojos enláguense abundantemente con agua tibia. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión produzcase el vomito, siempre y cuando el paciente esté consciente, introduciéndole un dedo en la garganta. Alternativamente a órdenes médicas se sigue el lavado gástrico. Consulte al médico inmediatamente.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

El coumatetrailil es un rodenticida anticoagulante perteneciente al grupo de las hidrocoumarinas. **Signos y síntomas de intoxicación:** náuseas, cansancio, apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión se presentan hemorragias mucocutáneas y hematuria, dolores abdominales y de espalda, erisipás, hemoptisis, hematomas y manifestaciones anórricas de la piel. **Tratamiento y antidoto:** administrar vitamina K1 (florhidrato) como antídoto específico por vía oral, intravenosa o endovenosa, tal como se indica para tratar síntomas de bishidrocoumarina. Repetir el tratamiento en caso de ser necesario, basándose en la observación del tiempo de prothrombina. La dosis máxima de vitamina K1 deberá ser de 40 mg/día.

Recomendaciones al Médico: **Vehículo:** los signos en las arañas aracónicas son similares a los del humano, se recomienda administrar vitamina K1 como antídoto a la dosis de 5 a 10 mg/kg SC u od durante 3 semanas. En casos graves se recomienda transfusión sanguínea previa prueba cruzada de compatibilidad sanguínea.

URGENCIAS

En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año), teléfono: 01 (59) 5598-6699 y 01 (59) 5611-2834; LADA SIN COSTO 01800 0095880.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no bebiendo o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o enemas, vapores.
- Mantenga el envaso vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Envasos Vacíos de Plaguicidas.
- El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua, no lo eche en drenaje ni en el suelo de los muelles acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).
- En caso de cada accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, incinerar el producto que sea, tal hasta donde sea posible, y lo demás recogido en un recipiente hermético y llevado al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.
- Este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).